

## Tema 5. (I) Proporcionalidad

## Resumen

La razón de dos números  $a$  y  $b$  es la fracción  $\frac{a}{b}$ . (Es su cociente, en el orden que se dice).

**Ejemplo:** Si en una clase hay 3 chicas por cada 2 chicos, la razón correspondiente, chicas–chicos, es  $\frac{3}{2}$ . La razón chicos–chicas es  $\frac{2}{3}$ .

Una proporción es la igualdad de dos razones. Esto es, una igualdad de la forma  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ .

Esa igualdad indica que las cantidades  $a$  y  $c$  son directamente proporcionales a las cantidades  $b$  y  $d$ , respectivamente. Puede leerse así: “ $a$  es a  $b$  como  $c$  es a  $d$ ”.

- Si dos magnitudes son directamente proporcionales, la razón entre las magnitudes correspondientes es la misma.

**Ejemplo:** Las magnitudes A y B, dadas en la tabla adjunta, son directamente proporcionales. Por tanto, todas las razones que se forman son iguales; esto es:

$$\frac{2}{3} = \frac{14}{21} = \frac{20}{30} = \frac{30}{y} = \frac{x}{60} = \frac{1}{k}$$

**Tabla 1. Directamente proporcionales**

Magnitud A	2	14	20	30	$x$	1
Magnitud B	3	21	30	$y$	60	$k$

Propiedad: En una proporción, el producto de los *extremos* ( $a$  y  $d$ ) es igual al producto de los *medios* ( $b$  y  $c$ ). Esto es:  $a \cdot d = b \cdot c$ .

- Esta propiedad permite encontrar el valor desconocido de uno cualquiera de los cuatro términos de la proporción, conocidos los otros tres.

**Ejemplos:** a) De  $\frac{2}{3} = \frac{30}{y} \Rightarrow 2 \cdot y = 3 \cdot 30 \Rightarrow y = \frac{3 \cdot 30}{2} = \frac{90}{2} = 45$ .

b) En un frutero hay peras y manzanas. La razón peras–manzanas es de 3 a 4. ¿Si hay 12 manzanas, cuántas peras habrá?

La proporción que se obtiene es  $\frac{3}{4} = \frac{x}{12} \Rightarrow 3 \cdot 12 = 4 \cdot x \Rightarrow 36 = 4x \Rightarrow x = 9$ .



Reducción a la unidad en la proporcionalidad directa: constante de proporcionalidad

En los problemas de proporcionalidad resulta útil saber cuánto vale B cuando  $A = 1$ . Ese valor se halla dividiendo el valor de B por su correspondiente en A. (Dividiendo la razón dada).

**Ejemplo:** En la Tabla 1 el valor de B cuando  $A = 1$  es  $3 : 2 = 1,5$ . Es el valor de  $k$  en la tabla,

que también puede obtenerse, por ejemplo, de la igualdad  $\frac{20}{30} = \frac{1}{k}$ . Sea como sea,  $k = 1,5$ .

- Conociendo el valor de  $k$ , los valores de B se hallan multiplicando los de A por  $k$ .
- Conociendo el valor de  $k$ , los valores de A se hallan dividiendo los de B por  $k$ .
- El valor de  $k$ , para dos magnitudes proporcionales, es siempre el mismo, y se llama constante de proporcionalidad.

**Ejemplo:** a) Para la Tabla 1, si  $A = 4 \Rightarrow B = 4 \cdot 1,5 = 6$ ; si  $A = 30 \Rightarrow B = 30 \cdot 1,5 = 45$ .

b) En la misma Tabla 1, si  $B = 15 \Rightarrow A = 15 : 1,5 = 10$ ; si  $B = 60 \Rightarrow A = 60 : 1,5 = 40$ .

Los problemas de regla de tres pueden resolverse:

- aplicando la propiedad de la igualdad de razones: cálculo del valor desconocido
- mediante la constante de proporcionalidad: reducción a la unidad.

**Ejemplo:** Si 15 vacas se comen 36 kg de pienso al día, ¿cuántos kg de pienso serán necesarios para alimentar a 50 vacas diariamente?


Para resolverlo se hace el siguiente esquema:

Si 15 vacas → comen 36 kg

50 vacas → comerán  $x$  kg → Las proporciones asociadas son:

$$\frac{15}{50} = \frac{36}{x}, \text{ o bien: } \frac{15}{36} = \frac{50}{x}. \text{ En ambos casos: } x = \frac{36 \cdot 50}{15} = 120 \text{ kg.}$$

- La solución mediante la reducción a la unidad consiste en determinar lo que come una vaca al día, que es  $\frac{36}{15} = 2,4$  kg. En consecuencia, 50 vacas comerán:  $2,4 \cdot 50 = 120$  kg.



Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número; o cuando al dividir la primera por un número, la segunda queda multiplicada por el mismo número.

**Ejemplo:** Las magnitudes A y B, dadas en la tabla adjunta, son inversamente proporcionales

Como puede observarse, al multiplicar la magnitud A (cuyo valor inicial es 2), por 2, por 4, ..., la magnitud B (de valor inicial 50) se divide por 2, por 4, ...

**Tabla 2. Inversamente proporcionales**

Magnitud A	2	4	8	20	$x$	1
Magnitud B	50	25	12,5	$y$	2,5	$k$

Propiedad: si dos magnitudes son inversamente proporcionales, el producto de las cantidades correspondientes es constante:  $2 \cdot 50 = 4 \cdot 25 = 8 \cdot 12,5 = 10 \cdot 10 = \dots = 20 \cdot y = x \cdot 2,5$ .

Esta propiedad permite encontrar la cantidad  $y$ , de B, correspondiente a cierta cantidad conocida de A. Y al revés, la cantidad  $x$  de A, correspondiente a una cantidad conocida de B.

**Ejemplo:** Para las magnitudes dadas en la tabla, los valores desconocidos  $y$  y  $x$  se pueden determinar fácilmente, ya que si  $2 \cdot 50 = 20 \cdot y$ , entonces  $y = 5$ ; y si  $2 \cdot 50 = x \cdot 2,5$ , entonces  $x = 40$ .

Reducción a la unidad en la proporcionalidad inversa

Es el valor de  $k$  en la Tabla 2, que puede obtenerse de la igualdad  $2 \cdot 50 = 1 \cdot k \Rightarrow k = 100$ . (Es el valor de B correspondiente al valor de  $A = 1$ ).

- Conociendo la constante  $k$ , los valores de B se hallan dividiendo  $k$  entre los valores de A.
- Conociendo la constante  $k$ , los valores de A se hallan dividiendo  $k$  entre los valores de B.

**Ejemplo:** a) Para la Tabla 2, si  $A = 2 \Rightarrow B = 100 : 2 = 50$ ; si  $A = 20 \Rightarrow B = 100 : 20 = 5$ .

b) Para la Tabla 2, si  $B = 10 \Rightarrow A = 100 : 10 = 10$ ; si  $B = 8 \Rightarrow A = 100 : 8 = 12,5$ .

Los problemas de regla de tres inversa pueden resolverse:

- aplicando la propiedad de los productos.
- mediante la constante de proporcionalidad: reducción a la unidad.

**Ejemplo:** Si 2 pintores encalan una pared en 20 horas, ¿cuántas horas tardarían en encalarla entre 5 pintores?

Para resolverlo se hace el siguiente esquema:

Si 2 pintores → tardan 20 h

$$5 \text{ pintores} \rightarrow \text{tardarán } x \text{ h} \Rightarrow 2 \cdot 20 = 5 \cdot x \Rightarrow 40 = 5 \cdot x \Rightarrow x = \frac{40}{5} = 8 \text{ h.}$$

- La solución mediante la reducción a la unidad consiste en determinar el tiempo que tardaría un solo pintor. Ese tiempo sería de 40 horas  $\rightarrow 2 \cdot 20 = 40$ ; el doble que si lo hacen entre dos. En consecuencia, entre 5 pintores emplearían  $\frac{40}{5} = 8$  horas.

